

Calendario de vacunación 2026

VACUNA EDAD	HEPATÍTIS B (HB)	BCG (1)	ROTAVIRUS (2)	NEUMOCOCO CONJUGADA (3)	QUINTUPLE PENTAVALENTÉ (DTP+HB+IPV) (4)	SALK (5)	NEUMOCOCOCA CONJUGADA (6)	ANTIGRIPAL	TRIPLE VIRAL (SRP) (7)	HEPATITIS A (HA)	VARICELA	TRIPLE BACTERIANA (DTp) (8)	TRIPLE BACTERIANA ACELULAR (dTpa) (9)	VPH (10)	DÓBLE BACTERIANA (dT) (11)	VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO (12)	FIEBRE AMARILLA (FA) (13)	FIEBRE HEMORÁGICA (FHA) (14)
RECÍEN NACIDO	1 ^a DOSIS (A)	DOSIS ÚNICA (C)																
2 MESES			1 ^a DOSIS (D)	1 ^a DOSIS	1 ^a DOSIS	1 ^a DOSIS (E)												
3 MESES								1 ^a DOSIS										
4 MESES				2 ^a DOSIS (D)	2 ^a DOSIS	2 ^a DOSIS	2 ^a DOSIS (E)											
5 MESES								2 ^a DOSIS										
6 MESES						3 ^a DOSIS	3 ^a DOSIS (E)											
12 MESES				REFUERZO								1 ^a DOSIS	DOSIS ÚNICA					
15 MESES								REFUERZO						1 ^a DOSIS				
15-18 MESES								REFUERZO					2 ^a DOSIS (I)					
18 MESES																1 ^a DOSIS (O)		
24 MESES																		
6 AÑOS INGRESO ESCOLAR								REFUERZO (E)					2 ^a DOSIS (I)		2 ^a DOSIS	REFUERZO		
11 AÑOS	(B)						DOSIS ÚNICA								DOSIS ÚNICA	DOSIS ÚNICA (L)		
ADULTOS	(B)			DOSIS ÚNICA (S)									(I*)			(M)		(Q)
EMBARAZADAS												DOSIS ANUAL (G)			DOSIS (J)		(N)	DOSIS ÚNICA (R)
PUERPERIO Ó POSTABORTO INMEDIATO												DOSIS ANUAL (H)						
PERSONAL DE SALUD	(B)											DOSIS ANUAL				DOSIS ÚNICA (K)		

(A) Aplicar antes de las primeras 12 horas de vida.

(B) Si no fue vacunado previamente aplicar 1^a dosis, 2^a dosis al mes de la primera y la 3^a dosis a los 6 meses de la primera. Si recibió alguna dosis previamente, completar con las dosis faltantes.

(C) Antes de salir de la maternidad.

(D) Administración por vía oral. Edad máxima de aplicación: 1^a dosis 14 semanas y 6 días. 2^a dosis 6 meses y 0 días.

(E) Aplicar una dosis de Salk (IPV) intramuscular.

(F) Los niños entre 6 y 24 meses deberán recibir en la primovacunación, 2 dosis de vacuna separadas al menos por 4 semanas.

(G) En cualquier trimestre de la gestación.

(H) Puérperas, si no la recibieron en el embarazo, aplicar dentro de los 10 días postparto.

(I) Niños nacidos a partir 1-7-2024 deben recibir 2^a dosis de TV a los 15-18 meses. Nacidos con anterioridad a esa fecha, será a los 5 años

(I*) Iniciar o completar esquema si no hubiera recibido 2 dosis de triple viral o 1 dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral, para los nacidos después de 1965.

(J) Se aplica en cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación.

(K) Personal de salud que atiende niños menores de 1 año. Revacunar a los 5 años.

(L) Mujeres y varones a los 11 años. UNICA DOSIS.

(M) El esquema primario es de 3 dosis con componente tétanos-difteria. Se continúa con un refuerzo cada 10 años.

(N) Mujeres no vacunadas previamente se indicará dT como esquema básico a partir del 2^o trimestre del embarazo, reemplazando una dosis a partir de las 20 semanas de gestación por triple bacteriana acelular (dTpa).

(O) Residentes en zonas de riesgo.

(P) Residentes en zonas de riesgo. Único refuerzo a los 10 años de la 1^a dosis.

(Q) Residentes o trabajadores con riesgo ocupacional en zonas de riesgo. A partir de los 15 años.

(R) Se aplica entre las semanas 32 y 36 del embarazo durante la temporada de circulación del VSR.

(S) Recomendada en adultos de 65 años o mas.

(1) BCG: antituberculosa. Previene formas invasivas.

(2) Previene las formas graves de la diarrea por rotavirus.

(3) Previene la meningitis, neumonía y sepsis por neumococo.

(4) DTP HB Hib (Quintuple/HB-Pentavalente): difteria, tétanos, pertussis, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b.

(5) Salk (IPV) vacuna inactivada de Polio.

(6) Previene la Meningitis y sepsis por meningococo A, C, W, Y.

(7) SRP (triple viral): sarampión, rubéola, parotiditis.

(8) DTP (triple bacteriana): difteria, tétanos, pertussis.

(9) dTpa (triple bacteriana acelular con contenido reducido de toxoide diftérico y pertussis): difteria, tétanos, pertussis.

(10) VPH (Virus Papiloma Humano)

(11) dT (doble bacteriana): difteria, tétanos.

(12) Virus Sincicial Respiratorio de la embarazada

(13) FA (Fiebre amarilla)

(14) FHA (Fiebre hemorrágica argentina): Candid #1