

Calendario de vacunación 2016

VACUNA	HEPATITIS B (HB)	BCG (1)	ROTAVIRUS (2)	NEUMOCOCO CONJUGADA (3)	QUÍNTUPLE PENTAVALENTE (DTP+Hib+HB) (4)	SABIN (OPV) (5)	ANTIGRI PAL	TRIPLE VIRAL (SRP) (6)	HEPATITIS A (HA)	VARICELA	CUÁDRUPLE (DPT+HIB) (7)	TRIPLE BACTERIANA (DPT) (8)	TRIPLE BACTERIANA ACELULAR (dTpa) (9)	VPH (10)	DOBLE BACTERIANA (dT) (11)	DOBLE VIRAL (SR) (12)	FIEBRE AMARILLA (FA) (13)	FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA (FHA) (14)
RECÍEN NACIDO	1ª DOSIS (A)	DOSIS ÚNICA (C)																
2 MESES			1ª DOSIS (D)	1ª DOSIS	1ª DOSIS	1ª DOSIS												
4 MESES			2ª DOSIS (D)	2ª DOSIS	2ª DOSIS	2ª DOSIS												
6 MESES					3ª DOSIS	3ª DOSIS												
12 MESES				REFUERZO				1ª DOSIS	DOSIS ÚNICA									
15 MESES										DOSIS ÚNICA								
15-18 MESES											REFUERZO							
18 MESES																	1ª DOSIS (N)	
24 MESES																		
5-6 AÑOS INGRESO ESCOLAR								2ª DOSIS				REFUERZO						
11 AÑOS	(B)								(H)				DOSIS ÚNICA	2 DOSIS (K)		(H)	REFUERZO (O)	
A PARTIR DE 15 AÑOS																		DOSIS ÚNICA (P)
A PARTIR DE 16 AÑOS ADULTOS	(B)														REFUERZO (L)			
EMBARAZADAS							DOSIS ANUAL (F)						DOSIS (I)		(M)			
PUERPERIO Ó POST ABORTO INMEDIATO							DOSIS ANUAL (G)									(H)		
PERSONAL DE SALUD	(B)						DOSIS ANUAL						DOSIS ÚNICA (J)			(H)		

(A) Aplicar antes de las primeras 12 horas de vida.

(B) Si no fue vacunado previamente aplicar 1ª dosis, 2ª dosis al mes de la primera y la 3ª dosis a los 6 meses de la primera. Si recibió alguna dosis previamente, completar con las dosis faltantes.

(C) Antes de salir de la maternidad

(D) Administración por vía oral. Edad máxima de aplicación: 1º dosis 14 semanas y 6 días. 2º dosis 6 meses y 0 días.

(E) Los niños entre 6 y 24 meses deberán recibir en la primovacuna, 2 dosis de vacuna separadas al menos por 4 semanas.

(F) En cualquier trimestre de la gestación.

(G) Púerperas, si no la recibieron en el embarazo, aplicar dentro de los diez días postparto.

(H) Aplicar una dosis si no recibió previamente 2 dosis de triple viral, o bien 1 dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral.

(I) A partir de la semana 20 de gestación. Se aplica en el 1º embarazo y luego en los embarazos siguientes si pasaron más de 3 años.

(J) Personal de salud que atiende niños menores de 1 año.

(K) Sólo niñas. Aplicar dos dosis con intervalo de 6 meses.

(L) Aplicar un refuerzo cada 10 años de la última vacunación antitetánica.

(M) Mujeres no vacunadas previamente se indicará dT como esquema básico a partir del 2º trimestre del embarazo, reemplazando una dosis a partir de las 20 semanas de gestación por triple bacteriana acelular (dTpa). Si el tiempo transcurrido desde el último refuerzo es mayor a 10 años, o el esque-

ma de vacunación está incompleto, se le completará el esquema reemplazando una dosis de dT por dTpa si es que nunca antes la había recibido.

(N) Residentes en zonas de riesgo.

(O) Residentes en zonas de riesgo. Único refuerzo a los 10 años de la 1ª dosis.

(P) Residentes o trabajadores con riesgo ocupacional en zonas de riesgo.

(1) BCG: antituberculosa. Previene formas invasivas.

(2) Previene las formas graves de la diarrea por rotavirus.

(3) Previene la meningitis, neumonía y sepsis por neumococo.

(4) DTP Hib (Quíntuple/HB-Pentavalente): difteria, tétanos, pertussis, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b.

(5) OPV (Sabin): vacuna anti poliomielítica oral.

(6) SRP (triple viral): sarampión, rubéola, parotiditis.

(7) DTP Hib (Cuádruple): difteria, tétanos, pertussis, Haemophilus influenzae tipo b. De no disponer se podrá utilizar la vacuna quíntuple/HB - Pentavalente.

(8) DTP (triple bacteriana): difteria, tétanos, pertussis.

(9) dTpa (triple bacteriana acelular con contenido reducido de toxoide diftérico y pertussis): difteria, tétanos, pertussis.

(10) VPH (Virus Papiloma Humano)

(11) dT (doble bacteriana): difteria, tétanos.

(12) SR (doble viral): sarampión, rubéola.

(13) FA (Fiebre amarilla)

(14) FHA (Fiebre hemorrágica argentina): Candid #1

